

VOLUME
189

2025년 11월호

이끼리

- 02 벼농사
- 04 밭작물
- 06 채 소
- 08 과 수
- 10 특용작물
- 12 축 산
- 14 농업경영
- 15 공공비축미곡
매입 일정
- 16 홍보사항



여수시농업기술센터(기술보급과)

벼 저장 관리



식량작물팀 | 659-4492

- 벼는 온도와 함수율이 높을수록 호흡 속도는 급속하게 증가하고 내부 성분이 분해되는데 걸리는 기간도 짧아짐
 - 품질손상을 줄이기 위해서는 15% 이하 함수율과 15℃ 이하 온도 및 70% 이하 습도에 저장함
 - 벼는 저장 온도가 낮을수록 발아율이 높게 유지되고 지방의 산화가 억제되어 연중 좋은 밥맛을 유지할 수 있음
- 저장 중에 발생하는 곰팡이나 해충은 악취, 변색, 발열, 독소 등을 생성시켜 벼 품질손상의 원인이 됨
 - 곰팡이는 벼 함수율이 14.5% 이상이고 저장 온도가 22℃ 이상의 경우 포자가 발생하고 균사가 형성됨
 - 해충은 함수율 12% 이하에서도 번식할 수 있지만 저장 온도가 15℃ 이하에서는 번식을 중지하고 10℃ 이하가 되면 생육이 중지됨
- 저장고에 건조 저장용 송풍기의 동력전달 벨트 장력, 보조열원 장치의 작동 유무 및 부대 시설에 대한 점검 실시
- 사일로 내부 공기 온도에 비해 바깥 공기 온도가 지나치게 낮아질 경우 사일로 내부에서 결로가 발생하므로 사일로 위쪽에 설치한 환풍기를 작동시켜 온도 차이가 없도록 조절함
- 곡물 온도를 매일 점검하며 겨울에는 약 2주일마다 직접 곡물을 점검하고 기록 관리함
- 저온 저장된 벼는 상온에 저장된 벼보다 함수율이 높은 경우가 많으므로 도정하기 전에 반드시 함수율을 확인해야 함
 - 함수율이 과도하게 높은 벼를 도정하면 유통 과정에서 쉽게 변질될 수 있으므로 주의가 필요함

2025년 문제 병 “깨씨무늬병”



식량작물팀 | 659-4492

① 깨씨무늬병

● 발생원인

- 양분 보유력이 낮은 토양에서 출수기 이후 양분결핍시 발생
→ 황화수소 발생에 의해 벼 뿌리가 부패되어 질소, 인산, 가리, 규산, 마그네슘, 망간 등의 흡수가 저해되어 발병이 많아짐
- 질소질 비료가 있어도, 망간, 철 부족시 발생
- (금년) 출수기부터 황숙기까지 비오는 날이 많고, 출수개화 후 고온이 지속된 해로병 발생이 많고, 특히 야간의 고온이 발병을 조장



벼
농
사

● 피해

- 출수기 이후 잎, 이삭가지, 이삭에 발병하여 수확량 감소(10~30%)
- 키, 이삭길이 짧아짐, 등숙률 25%감소

● 방제

- (경 종 적) 종자전염(수확 후 벧짚 수거), 녹비작물재배, 객토 및 퇴구비사용
발병상습답 경우 매년 규산시용 및 알거름(질소, 과잉시비시 병발생 조장) 시비
 - (약제방제) 종자소독, 작물보호제 살포
- ※ 방제 시기: 수잉기, 출수기, 다발생지역 유숙기(출수 10일 후) 1회 추가 살포
- (일반재배) 작물활성제(망간+철) 및 살균제 살포
 - (친 환 경) 트리코더마 미생물제 및 작물활성제



유기물, 규산 및
작물활성제 사용



겨울철 맥류 재배기술 및 관리 요령



식량작물팀 | 659-4491

1 적기 파종

- 우리 지역 파종 적기 : 10월 20일~ 11월 10일
- 파 종 량 : ※ 품종 특성, 기상 조건, 토양 상태에 따라 조정 필요

맥종	파종 방법	10a당 파종량(kg)	비 고
보리	흠어뿌림	18 ~ 22kg	· 흠어뿌림 : 손으로 뿌리거나 간단한 도구로 넓게 뿌리는 방식→ 파종량 많음 · 줄 뿌 림 : 일정한 간격으로 줄을 맞춰 뿌리는 방식 →파종량 절감, 관리 용이
	줄뿌림	15 ~ 18kg	
밀	흠어뿌림	20 ~ 25kg	
	줄뿌림	18 ~ 22kg	

- 흠어뿌림은 입모율이 낮고 손실이 더 크기 때문에 파종량을 더 늘려야 함
- 파종량이 너무 많으면 도복 위험이 커지고, 너무 적으면 수량이 감소
- 맥류는 본격적인 겨울 추위가 시작되기 전에 식물체 잎이 5~6개 정도 있어야 얼어 죽지 않고 안전하게 겨울을 날 수 있음
- 너무 일찍 파종 시 월동 전에 유수(어린이삭)가 형성되어 저온에 취약해지므로 적기에 파종함

2 거름주기

- 맥종별 품종 특성에 따른 비료량

* 10a : 1,000㎡(300평)

맥종	도복	성 분 량(kg/10a)			실 량(kg/10a)		
		질소	인산	칼리	요소	용과린	염화加里
보리	강	9.1	7.4	3.8	20	37	6
	중약	7.8	6.8	3.1	17	34	5
맥주보리	강	7.8	7.4	3.8	17	37	6
	중약	5.2	6.8	3.1	11	34	5
밀	강	8.5	7.0	3.5	19	35	6
	중약	7.0	6.5	3.0	16	32	5

- 질소(N) : 잎과 줄기 성장 촉진
- 인산(P) : 뿌리 발달 및 초기 생육 강화
- 가리(K) : 도복 방지, 병해 저항성 향상 및 수량 안정화

● 밀거름 주기(보리 기준)

- 단비 시비량(kg/10a) : 요소 8 - 용과린 14 - 염화加里 3
- 복비 시비량(kg/10a) : 예) 슈퍼21(21-17-17) 15 ~ 20

● 웃거름 주기

구 분	보리, 밀	맥주보리
밀거름:웃거름 비율(%)	40:60	60:40
웃거름 시비량(요소)	10a당 9~12kg	10a당 7kg

- 시기 : 2월 상·중순경 (맥류 생육재생기 판단 직후 10일 이내)
- 웃거름은 노동력 절감을 위해 한 번에 주어도 되지만, 모래땅이거나, 작황불량 포장은 2회 나누어 살포. 단, **맥주보리는 웃거름을 한 번에 줌**
- 파종을 늦게 했거나, 동해가 심한 지역에서는 인산(P)과 가리(K)를 기준보다 20~30% 더 줌


3 습해 예방

● 습해로 황화현상 발생하면

- 즉시 배수로에 고인 물이 빠지도록 정비
- 표준 웃거름 양보다 요소를 50% 늘리거나, 엽면시비로 요소 2%액(물 20L에 요소 400g)을 10a당 100L 뿌리되 2~3회 정도 뿌리면 회복이 빨라짐



| 물바짐이 불량한 포장 |



| 물바짐 고랑 설치 요령 |



| 습해로 인한 보리 황화현상 |

4 저온 피해 대책

구분	시기	대책
동해	파종 전	· 내한성이 강한 품종 선택 및 적기 파종 · 퇴비, 인산, 칼륨비료 충분히 주기 · 정밀파종(균일 복토), 만파 시 파종량 증가 · 저온 피해 예상될 시 왕겨, 볏짚 덮기
	파종 후	· 배수구 정비 철저, 흙넣기와 보리·밀밟기(진압) · 유기물 덮어주기(씨 뿌린 직후, 생육 중) · 조기 회복을 위해 속효성 황산암모늄을 웃거름으로 주어 생육 촉진

배추·무 저온대비 및 적기수확



소득작목팀 | 659-4488

1 저온 대비

- 갑작스러운 추위에 의해 동해를 입을 수 있으므로 부직포, 비닐 등 준비, 기상예보에 따라 덮어줌
 - 0℃ 이하로 내려갈 때 : 부직포 피복 등 응급조치, 언 피해 예방효과 : 비닐+부직포 > 비닐
 - ※ 언 피해 발생 : 배추 -8.0℃ 내외, 무 -1.5℃ 이하

2 후기 관리

- 병해충 방제(결구 전까지) : 노균병, 균핵병, 진딧물, 나방류 등 예찰 및 방제
- 후기에는 관수를 줄여주고, 생육부진 포장은 요소 0.2%액(40g/20L)을 잎에 뿌려줌

3 적기 수확

- 배추 · 무 수확시기

구 분	배 추	가을무(얼기 전 수확)
수확시기	11월 하순 ~ 12월 상순	11월 상순 ~ 하순

- 동절기 수확방법 : 맑은 날 오전 8시 ~ 오후 4시(상온)
 - * 비가 왔을때에는 2~3일 지난 후에 수확하는 것이 바람직함.
- 수확 시 유의사항
 - 맑은 날 깨끗한 장갑을 착용한 후 수확작업을 함
 - * (배추) 지제부 절단 후 겉잎 제거 : 직출하용 6~7매, 장기저장용 4~6매, 김치가공용 8~9매
 - 수확용 칼은 예리하게 갈아서 사용, 칼날 토양 접촉 않도록 주의
 - 수확 중간에 칼날을 소금물(소금 7g/물 1L)에 담가 소독
 - 무청을 너무 바삭 자르면 자른 부위에 미생물 오염이 많아 부패 진행이 빨라지므로 주의


수확기 판단



결구도 80%(저장용) (결구 잎이 겉잎에 싸여 있음)



결구도 90%(직출하용) (결구 잎 선단이 겉잎과 나란함)



※ 직출하용은 시장 여건에 따라 결구도 80~90%에서 수확을 권장

마늘·양파 월동 전 관리



소득작목팀 | 659-4488

① 물 관리 및 잡초제거


- (물관리) 양파 **정식 후 물을 충분히 주어야** 뿌리가 잘 뻗고, 활착이 잘됨
- 겨울에도 토양이 건조하면 찬공기가 토양 속에 있는 뿌리까지 쉽게 들어갈 수 있어 얼어 죽기 쉬움
 - **물은 따뜻한 날 일찍 주어** 오후에는 햇볕에 지온이 올라가게 함
- 물은 분수 호스나 스프링클러 등으로 이랑 위로 주는 것이 좋음
 - 토양이 건조하면 토양 중의 양분 흡수 저해 및 동해 우려
- (잡초제거) 잡초는 **일찍 제거**하되, 마늘·양파 뿌리나 잎이 손상되지 않도록 함
 - 난지형에 잡초약 사용할 때는 비닐은 3~4일 지난 후에 덮고 고정함

② 서릿발 피해 예방


- 뿌리가 충분히 뻗지 못한 포장에서 흙이 얼었다가 녹을 때 발생함
- **숟구쳐 올라온 마늘, 양파는 잘 눌러주고** 뿌리부분이 완전히 묻히도록 흙을 덮어줌
- 토양이 과습하면 뿌리가 습해를 받으므로 **고랑에 물이 고이지 않게 배수로로 정비**

③ 병해충 예방

- **양파 노균병(초기)** : 연한 노란색으로 변하면서 회색의 곰팡이 형성
 - 방제 : 묘상, 아주심기 전후, 월동 전후(등록약제 2~3종을 선택 및 살포)
 - 전년도 발생, 발생우려 시 아주심은 후 7일 간격으로 2회 예방 살포
- **흑색썩음균핵병** : (초기) 인경에 흰색 곰팡이, (진전) 전체가 흑색으로 변해 썩음
 - 방제 : 종구 소독, **파종·정식 전후, 월동 직후(1월말)** 등록약제 예방적 방제
- **무름병** : 습해 받은 포장에 적용약제를 뿌려 예방, 식물체에 상처가 나지 않도록 유의



| 노균병 감염(유묘기) |



| 흑색썩음균핵병 |



| 무름병 |

단감 수확 후 관리 요령



소득작목팀 | 659-4488

1 수확기 판정

- 단감 수확은 품종 고유 색깔로 착색되어 당도가 충분한, 완숙된 것부터 3~4회 나누어 수확함
- 수확시기는 과피색, 당도, 크기, 경도 등을 고려하여 결정함
- 수확기 무렵에 비대와 착색이 급속도로 진행되므로 수확기를 판정하는 것이 무엇보다 중요함
- 우리나라에서 주로 재배되는 '부유' 품종은 열매 주두부(과정부), 열매 꼭지부, 적도부의 색깔 정도를 구분할 수 있음
- '부유' 품종은 과실의 적도 부위가 단감 색도계의 4이상으로 착색되었을 때 수확함

품 종	개화 후 성숙 소요 일수	성숙기	과실무게(g)	당도(브릭스)
서촌조생	120	9월 하순	200	15.0
상서조생	130~140	10월 상순	230~250	15.0
차랑	150	10월 하순	210~250	16.0
부유	155~160	10월 하순~11월 상순	210~220	15.0~16.0

2 출하 목적에 적합한 수확기 판정

- 수확시기가 너무 빠르면 경도는 높으나 크기가 작고 맛이 나쁨
- 수확시기가 늦으면 착색과 당도는 증가하나, 경도가 낮아 유통 중 쉽게 무름
- '부유' 품종을 생과로 출하하는 경우 칼라차트 색도가 과정부(주두부 6.0, 과저부(꼭지부) 5.0(등황색) 정도이면 완숙 과실의 품질을 낼 수 있음



- ‘부유’ 품종을 저장할 때는 수확기를 앞당겨 칼라차트 색도가 과정부 5.0, 꼭지부 4.0, 정도에 수확하여 저장



‘태추’ (컬러차트 : 3.5)



단감 색도계



‘부유’ (컬러차트 : 5)

- 우리나라는 서리가 11월 중순 이후 내리는 지역을 제외하고는 완숙기까지 도달하기가 어려우므로 남부지방의 단감 주산지에서는 색도가 과정부 5.0, 과정부 4.0 이상이면 ‘부유’의 수확기로 판단함
※ 기상조건과 지역에 따라 다르나 이때는 대개 11월 상순경에 해당

3 수확방법

- 수확 가위를 이용하여 과실을 하나하나 따는 것이 바람직함
- 수확 시에 부주의한 취급은 저장력에 크게 영향을 미치므로 꼭지나 주두에 의한 상처가 나지 않도록 짧게 잘라 주어야 함
- 운반 시 플라스틱 컨테이너와 같이 단단한 용기를 사용하거나, 또는 모노레일로 운반 작업을 할 경우 진동이나 충격에 의한 과실의 압상이 우려되므로 특히 운반에 주의해야 함
- 그 외 태풍피해로 낙엽이 20% 이상인 과원이나, 병충해 피해를 심하게 받은 과원의 과실이나 재배 중에 탄저병 등 병해를 입은 과수원의 과실은 저장력이 약하므로 장기저장을 피하는 것이 좋음



환절기 호흡기 건강, 특용작물로 챙기세요

생강, 둥굴레, 맥문동



소득작목팀 | 659-4487

호흡기에 좋은 생강, 둥굴레, 맥문동 건강 효과와 가정에서 활용하는 방법 소개

특용작물은 한약재뿐 아니라 식품 소재로서도 주목받고 있습니다. 특용작물 특성을 제대로 알고 잘 활용하면 겨울철 호흡기 건강을 지킬 수 있습니다. 환절기 호흡기 질환을 예방하고 증상을 완화하는데 특용작물을 이용해 보면 어떨까요?

1 생강



- 생강은 성질이 약간 따뜻하고 맛은 매워 몸을 따뜻하게 하고 구토, 가래, 기침을 멎게 하며 해독 작용을 합니다. 감기에 걸려 몸이 오들오들 떨리고 추위를 타면서 가래와 기침이 나올 때 섭취하면 좋습니다.
- 생강의 매운맛 성분인 진저롤(gingerol)과 쇼가올(shogaol)은 혈액순환을 촉진하고 혈압과 체온을 정상화하는 효능이 있습니다.
- 가정에서는 생강가루를 요리에 넣거나, 편 또는 채로 썰어 설탕에 재워 차로 마시면 좋습니다.
- 돼지고기에 생강 소스를 더해 구우면 특유의 누린내를 줄일 수 있으며, 풍미도 살고 소화를 돕습니다.

2 동굴레



- 백합과의 여러해살이 식물인 동굴레는 몸 안의 진액을 보충하고 건조해진 것을 윤택하게 하는 효능이 있어 마른기침을 멎게 하는 효능이 있습니다.
- 다당류, 알칼로이드, 스테로이드계 사포닌, 플라보노이드, 리그닌 같은 생리활성 성분이 풍부합니다.
- 동굴레는 뜨거운 물에 우려 마시는 방법이 일반적이지만, 통째로 가루를 내어 음식에 넣어 먹을 수도 있습니다.
- 삶은 동굴레 뿌리줄기를 갈아 밀가루와 함께 반죽한 뒤 동굴레 우린 물에 수제비 반죽을 넣고 끓이면 특유의 구수한 맛을 느낄 수 있습니다.

3 맥문동



- 맥문동은 ‘뿌리 덩어리가 보리(麥)와 비슷하고 겨울(冬)에도 죽지 않는다.’ 라고 해서 붙여진 이름입니다. 성질은 약간 차고 단맛이 나는데, 호흡기가 건조해지는 것을 막고 마른기침을 치료하는 효능이 있습니다.
- 사포닌, 아미노산 등 다양한 성분을 함유하며 혈당 강하, 항염증 등의 효능이 보고되어 있습니다.
- 맥문동은 궁합이 잘 맞는 약재와 함께 끓여 마시면 좋습니다. 인삼과 오미자, 맥문동을 1:1:2의 비율로 물과 함께 끓인 생맥산은 새어나간 기운을 보충하고 깨진 전해질 균형을 맞춰 줍니다. 새콤하고 구수해 맛도 좋습니다. 한방에서 생맥산은 주로 여름철에 처방하지만, 환절기 오랜 기침을 멈추는 데도 효과가 있습니다.

축사 전기화재 및 정전 예방



소득작목팀 | 659-4481

1 전기화재 위험 증가

- 난방기와 환기시설 가동 등으로 과도한 전력이 사용되어 누전이나 합선으로 인한 화재 위험 증가
- 플러그 및 콘센트 정기점검, 낡거나 손상된 전기기구 즉시 교체
- 전기기구 접촉 상태 주기적 확인 및 주위의 먼지·거미줄 제거
- 공인된 안전 인증을 받은 전기기구 사용
- 콘센트나 소켓 하나에 여러 개의 전기기구 연결하지 말아야 함

2 정전 발생 시 피해 예방

- 자동급이기 및 환기시스템 등 전기 자동화 시설이 설치된 축사는 정전 발생 시 큰 피해로 이어질 수 있음
- 정전 발생을 알려주는 경보기를 설치하는 것이 좋음

3 무창돈사 및 계사 정전 대비

- 무창돈사나 계사는 정전 시 환기 팬이 멈추면 질식사 위험이 커짐
- 정격전류 초과로 인한 전원 차단에 대비하여 전기 설비를 주기적으로 점검해야 함
- 비상 대비용 자가발전기는 평소 필요한 전력의 120% 용량 확보
- 주 1회 이상 연료 점검 및 발전기 상태 확인으로 비상 상황에 대비

4 화재 예방을 위한 추가 관리

- 가을~겨울철 건조한 날씨로 인해 작은 불씨가 큰 피해를 초래할 수 있으므로 불씨 관리 유의 (전기기구 주변의 벼짚 및 건초 정리)

양봉 해충 관리



소득작목팀 | 659-4481

양
봉

1 응애

- 청명한 날에 월동벌의 응애류 최종 방제 실시
- 약제 처리로 발생하는 저온과 습기로 인한 벌 피해 주의

2 말벌

- 장수말벌의 활동은 뜸해지지만, 등검은말벌 피해는 11월까지 지속
- 등검은말벌은 이른 아침부터 저녁 늦게까지 계속해서 비래하여 일벌을 낚아채 가므로 방치할 경우 장기적으로 월동벌 양성에 극심한 피해 발생
- 끈끈이 트랩, 유인트랩, 포충망 직접 포획 등의 방법으로 방제하여 피해 최소화

3 나방

- 봉군 세력이 매우 약하거나 방치된 벌통 내 벌집이 있을 경우 꿀벌부채명나방에 의한 피해 발생
- 꿀벌부채명나방 유충이 벌집을 돌아다니면서 유충 및 벌집에 직접적인 피해를 입힘

4 거미

- 양봉장 주변을 수시로 점검하여 거미줄을 제거
- 아침·저녁으로는 거미를 쉽게 찾을 수 있으나, 낮에는 은닉하는 경우가 많아 거미줄을 제거 하면서 거미도 찾아서 없애야 효과가 있음



주요농산물 가격정보



과학영농팀 | 659-4475

구 분		서울	부산	광주	순천	전국평균	전년동월
쌀 20kg	유기농	155,125	151,750	118,500	-	146,260	128,200
	무농약	119,250	124,500	124,750	-	122,500	106,665
	일반	67,510	68,140	66,900	69,867	65,351	53,679
감자 (수미) 1kg	유기농	4,265	4,220	-	-	4,347	7,110
	무농약	8,656	6,977	4,220	-	6,869	5,783
	일반	3,490	3,560	5,170	4,570	3,850	3,340
상추 (적) 100g	유기농	2,703	3,717	1,573	-	2,863	4,053
	무농약	3,323	3,783	2,060	-	3,181	4,215
	일반	2,083	2,090	2,040	1,915	2,009	2,737
깻잎 100g	유기농	4,367	9,500	3,250	-	5,703	5,200
	무농약	7,643	6,467	7,933	-	7,480	7,937
	일반	3,305	2,748	2,760	3,245	2,996	3,947
양파 1kg	유기농	5,233	-	3,065	-	4,222	5,850
	무농약	4,563	5,353	4,185	-	4,844	4,429
	일반	2,132	1,760	2,073	1,995	2,091	2,157
마늘 (깐마늘) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	33,261	33,888	27,833	-	32,625	31,073
	일반	10,519	9,313	10,650	9,105	10,556	10,220
토마토 1kg	유기농	13,550	-	-	-	13,550	14,960
	무농약	12,013	12,530	8,995	-	11,222	15,313
	일반	7,134	6,943	7,757	7,870	7,159	11,572
파 (대파) 1kg	유기농	5,733	-	-	-	8,023	12,003
	무농약	11,253	9,916	-	-	11,473	12,606
	일반	3,054	3,338	3,713	4,055	3,176	3,481
팽이버섯 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	5,253	5,180	5,500	-	5,833	5,366
	일반	4,026	4,146	3,780	4,480	3,933	3,753

※ 자료출처 : 한국농수산식품유통공사(2025. 10 10.), 전년동월(2024. 10. 8./유기농,무농약) 기준
 ※ 자료검색방법 : www.kamis.or.kr (친환경농산물, 가격정보 → 소매가격 → 품목별을 이용하면
 보다 다양한 농산물의 가격정보를 검색할 수 있습니다)

2025년산 공공비축미곡 매입 일정 안내



1 공공비축미곡 매입개요

- **매입기간** : 2025. 11. 4. ~ 11. 28.(25일간)
- **매입물량** : 939톤(23,488포/40kg) * 1차 배정
※ 전년대비 1차 배정(공공비축) 16%감소
- **매입가격** : 수확기 전국평균 산지 쌀값을 조곡(벼 40kg)으로 환산 매입
※ 중간정산금(4만원) 수매 직후 지급 후 12월말 최종정산
- **매입방법** : 포대벼(40kg), 톤백(800kg) 매입
- **매입품종** : **새청무, 강대찬**

※ 2026년은 '새청무' 예정

매입일자	시간	읍면동	매입장소	매입대상마을
11. 4.(화)	08:30	울촌면	조화농협창고	가장, 난화, 중산
	09:30			연화, 상봉1·2구, 광암, 봉전
	10:30			삼산, 반월, 취적1·2구, 신산1·3구, 신흥, 덕산
11. 5.(수)	09:00	소라면	사곡농협창고	사곡
	11:00		관기농협창고	관기, 현천1리
	08:30	여천동	월곡창고	내동, 반월, 무선
	09:30	주삼동	월곡창고	주암, 주동, 월양, 봉강, 계원·장곡, 대곡·월산, 해지, 대평·오산·기동
11. 6.(목)	09:00	소라면	덕양농협창고	덕양, 대포, 봉두
11. 7.(금)	08:30	만덕동	상촌마을버스정류장	평촌, 상촌
	09:30	둔덕동	용수마을	용수마을
	10:30	삼일동	상암농협앞	신덕, 작산, 읍동, 원호명, 호명내동
11.10.(월)	09:00	소라면	우리쌀주식회사육묘장	현천2, 복산, 관외
11.11.(화)	08:30	돌산읍	죽포농협창고	죽포, 두문, 서기, 덕곡, 백포
	10:30		둔전농협창고	둔전, 봉수, 월암
	13:30		도실농협창고	신기, 대북, 예교, 도실, 상동, 하동
	09:00	묘도동	온동 마을회관	온동, 도독
	10:00		읍동 마을회관	읍동
	11:30		창촌 마을 선창팔각정	창촌
	11:30			
11.13(목)	09:00	화양면	여천농협화동지점	화동, 청양, 서촌, 봉오, 서연, 구미, 장수, 안포
	10:30		여천농협화양지점창고(구)	소장, 용주, 화련, 창무
	08:30	울촌면	조화농협창고	조화, 여흥1·2구, 월산1·2구, 청산1·2구, 봉두
	09:30			산수1·2구
	10:30			구암1·2구, 신평1구
11.14.(금)	09:00	화양면	소백초마을(승강장)	백초, 이천
	10:30		옥적마을(승강장)	감도, 마상, 옥적, 대옥, 상전

※ 상기일정은 변경될 수 있음.

2 농업인 협조사항

- '25년산 공공비축미곡 매입품종(새청무, 강대찬)만 출하
* 타 품종 출하 후 적발 시 5년 동안 공공비축 출하금지

[문의] 농산물유통과 유통시설팀(☎ 659-4514), 읍·면·동 주민센터

1 내년 농사의 첫 걸음, 종자 준비!, 정부보급종 종자신청 일정 안내

☑ 주요 작물 신청·접수 일정

작 물	신청 기간	공급 기간	신청 단위	신청 품종
벼	'25.11.21. ~ 12.20.	'26. 2월 ~ 3월	20kg/포대	조명1호(조생종), 새청무(중만생), 영호진미(중만생), 백옥찰(중만생), 동진찰(중만생)
감자	'25.11. 24. ~ 12.26.	'26. 2월 초순	20kg/상자	수미, 두백
옥수수	11월 중순 ~ 12월 말	'26. 1월 중	1kg/봉지	미백 2호, 미흑찰 등(미정)

※ 시군별 공급량 미확정으로 신청량 전부를 공급받지 못할 수 있습니다.

※ 가격 미정, 품종변경 될 수 있음 → 확정되면 농업인상담소, 읍면동에 확인 가능

※ 우리시 2026년 벼 수매품종 : 공공비축미는 새청무(단일품종) / 여천농협은 미정('25.12월 결정)

☑ 신청 장소

- 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면: 관할 농업인상담소
- 그 외 지역 : 관할 면·동주민센터

※ 위 내용은 대략적 정보로, 자세한 사항은 기술보급과 식량작물팀(☎659-4491)으로 문의


2 유용미생물 연중 생산 무상공급 합니다!

문의 : 기술보급과 유용미생물 배양실(☎659-4469)

- ☑ 공급 기간 : 연중 09:00~18:00(토·일요일, 공휴일 제외)
- ☑ 공급 장소 : 여수시농업기술센터 유용미생물 배양실
- ☑ 미생물종류 : 4종(광합성균, 고초균, 유산균, 효모균)
- ☑ 공급 방법 : 여수시민 무상공급(본인 직접방문 수령)
※ 방문신청 시 여수시민 확인을 위해 신분증 지참 / 목적 외 사용, 미사용방치시 공급이 제한될 수 있음
- ☑ 용 도 : 농업(토양개량, 생육촉진 등), 축산·생활·환경(악취저감, 환경정화 등)

3 '여수시 유기동물보호소' 에서 보호하고 있는 유기동물을 입양해주세요.

- ☑ 입양대상 : 유기동물보호소에서 보호 중인 개 또는 고양이
- ☑ 참여방법 : 유기동물 공고번호 확인 후 입양 문의
※ 공고번호 확인 방법
- 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr),
스마트폰 어플 '포인핸드', 네이버에 '여수 유기동물' 검색
- ☑ 문 의 : 농업정책과 반려동물팀(☎659-2472)
※ 유기동물 입양으로 다른 생명도 소중히 여기는 성숙한 반려인이 되어주세요.



여수시 농업기술센터 기술보급과

Tel. 659-4490~4494 Fax. 659-5845 <http://www.yeosu.go.kr/agr>