

2026
여수세계섬박람회
2026.9.5. - 11.4.

여수시 월간 농업기술지
This Month Agricultural Technology

VOLUME
198

2026년 8월호



- 02 벼농사
- 05 밭작물
- 06 채소
- 09 과수
- 11 특용작물
- 13 축산
- 14 농업경영
- 15 농기계임대
- 16 홍보사항

 여수시농업기술센터
(기술보급과)

벼 병해충 기본방제 및 본논 후기 물관리



올해 유독 잦은 국지성 호우와 폭염이 교차하면서 벼 병해충 발생 우려가 커지고 있습니다. 적기 방제와 수확 전 세밀한 물관리를 통해 고품질 쌀을 생산할 수 있도록 아래 사항을 준수해 주시기 바랍니다. ※ 우리 시 기본방제기간(7. 20. ~ 8. 14.)

01 주요 병해충 기본방제

《이삭도열병》

- ☑ (발생환경) 여름철 기온이 20~25도로 낮아진 상태에서 3일 이상 연속으로 비가 내려 습기가 많아지면 잘 발생함
- ☑ (증상) 벼가 익는 시기에 이삭목에서 발생하여 감염 부위가 갈색으로 변하면서 양분 이동이 억제돼 이삭 전체가 말라 죽음
- ☑ (방제) 최근 도열병 발생이 많았던 지역은 이삭 패기 전후 예방 위주로 약제를 살포. 일반 유제, 수화제, 액제는 2회 방제하고, 약효가 긴 침투이행성 입제나 수화제는 1회 방제

《세균벼알마름병》

- ☑ (발생환경) 이삭 패기 전후 30도 이상 의 높은 기온과 다습한 환경이 계속될 때 잘 발생하며 최근 여름철 고온과 잦은 비로 병이 증가하는 추세를 보이므로 수시로 살펴 초기에 방제
- ☑ (증상) 감염 초기에 벼알이 맏히는 부분부터 갈색으로 변하면서 점차 벼알 전체가 변색 되고 여물지 않아 이삭이 꼳꼳하게 서 있음
- ☑ (방제) 이삭 패기 전후에 가스가마이신, 옥솔린산 성분 등의 등록 약제로 방제. 종자를 통해 전염되므로 건전 종자 사용이 필수

《깨씨무늬병》

- ☑ (발생환경) 양분보유력이 낮은 토양(노후화답, 사질토 등)
- ☑ (증상) 잎에 암갈색 작은반점, 줄기에는 흑갈색의 작은 무늬 형성 및 벼알에는 암갈색 작은반점 형성
- ☑ (방제) 트리사이클라졸, 카프로파미드, 페림존 계열 등 등록약제로 방제



이삭도열병



세균성벼알마름병



깨씨무늬병

《먹노린재, 벼멸구, 흰등멸구, 흑명나방》

- ☑ (멸구류) 벼멸구, 흰등멸구는 초기 방제가 수확량을 크게 좌우. 벼대 아래쪽을 수시로 관찰하여 발생 밀도가 높으면 즉시 적용 약제로 방제
- ☑ (흑명나방) 논을 살펴보아 포장에 피해 잎이 1~2개 정도 보이거나 벼 잎이 세로로 말리는 유충 피해 증상이 보이면 적용약제 살포함



벼멸구



벼멸구 약충(좌) 및 성충(우)



흰등멸구 혼서



흑명나방 성충(좌) 및 유충(우)

02 본논 후기 물관리

- ☑ 조생종이나 일찍 심어 벼 이삭 패기가 완료된 후 익어가는 시기에는 벼 뿌리에 산소 공급이 잘 이루어지도록 물을 2~3cm로 얇게 대고 논물이 마르면 다시 대어주는 물 걸러대기 실시
- ☑ 쌀 품질과 크게 관련 있는 완전 물떼기 시기는 **출수 후 30~40일경이 적기임**
 - 물떼기 시기가 적기보다 빨라지면 벼알이 충실하게 여물지 못하고 청미·미숙립 등 불완전미가 증가하여 수량과 품질이 저하됨
 - 물을 너무 늦게 떼면 수확 작업이 늦어져 깨진 쌀이 많이 발생함
 - 늦게 심어 이삭 패는 시기가 9월 이후로 늦어지면 여물 속도가 늦어지기 때문에 출수 후 40~45일까지 논물을 대주어 여물 비율을 향상

구 분	물 대는 요령	물깊이	효 과
이삭 벨 때(수잉)	물 걸러대기	2~4cm	부리활력 증대, 유해물질 제거
이삭 팠 때(출수)	보통으로 댈 것	3~4cm	꽃가루받이 촉진
이삭 여물 때(등숙)	물 걸러대기	2~3cm	등숙양호, 부리기능 유지
물떼기(낙수)	완전 물떼기(이삭 팬 후 30~40일)	-	품질향상, 농작업 편리

※ 품종, 지대별 이양적기 차이, 가뭄에 의한 이양지연 등에 따라 생육단계에 차이가 있음

〈벼 출수기별 수확적기〉

품 종	출수기	출수 후 일수
조생종	8월 초	45~50일
중생종	8월 상순	50~55일
중만생종 또는 만식	8월 중순 이후	55~60일

* 출수 후 수확기 적산온도(1,100~1,200℃)

03 무인항공(드론) 및 공동방제 시 유의사항

- ✓ **비산 피해(PLS) 주의** : 인접한 타 작물에 농약이 날아가지 않도록 바람이 적은 시간에 작업 하고, 비행 고도와 속도를 철저히 준수
- ✓ **약해 예방** : 8월의 폭염기에는 한낮 고온에 약제를 살포하면 수분이 급격히 증발해 농도 장해(약해)가 발생할 수 있으므로, **이른 아침이나 해 질 녘에 방제 요망**

※ 벼 일반단지 돌발 병해충 사전 대응 공동 항공방제 지원사업 추진

- 사업량: 456ha(9개 읍면동) ※ 친환경단지 제외(농업정책과 지원)
- 사업내용 : 벼 일반단지 1차 항공방제 및 2차 돌발병해충 방제 지원
- 방제 시기: 1차(7. 20.~8. 14.) / 2차(8월 말~ 9월 중순)



┃ 드론 활용한 공동 방제(2025년)

8월 콩 재배관리 요령



01 콩 추비

- ✓ 시기 : 개화기(꽃이 약 40~50%) 피었을 때(8월 상순~중순)
- ✓ 방법 : NK복합비료 300평(약990㎡) 당 20kg 1포(또는 10kg 2포) 골고루 살포
- ✓ 주의사항 : 비료가 잎에 오래 묻지 않도록 하고, 토양에 적당한 수분이 있는 상태 또는 비가 오기 전 살포하면 효과적

02 집중호우 이후 관리


- ✓ 집중 강우로 침관수된 포장은 조속히 물빼기를 실시
- ✓ 뿌리가 심하게 노출된 포장은 잡초 제거를 겸하여 복주기를 실시

03 병해충 예찰 및 적기 방제


- ✓ 노린재, 진딧물, 콩나방, 탄저병 등은 등록된 전용약제를 사용하여 잎과 꼬투리에 피해가 없도록 방제
- ✓ 노린재, 진딧물 : 오전 또는 해질 무렵 방제, 10일 간격으로 2~3회 방제
- ✓ 콩나방, 콩혹파리 : 노린재 방제 약제로 동시 방제 가능



| 톱다리개미허리노린재



| 알락수염노린재



| 썩덩나무노린재



| 풀색노린재



| 콩 나방



| 콩 혹파리



| 노린재 피해 종자



| 탄저병

여름철 고추 안정생산 재배기술



01 주요 병해충 예방 및 방제

☑ 탄저병

- 과실에 주로 발생하므로 약액이 과실에 충분히 묻도록 **밑에서 위로** 뿌려주고 비가 온 후에는 반드시 방제를 해줌.
- **병든 과실은 빨리 제거**, 이랑 사이에 부직포 등을 깔아서 빗물로 인한 전파를 막아줌.

☑ 역병

- 빗물이 빨리 빠질 수 있도록 배수로를 정비하고 이랑을 높여줌.
- 상습 발생지에는 비기주작물(콩, 팥 등 콩과 작물, 보리, 밀, 옥수수 등 화본과 작물)로 돌려짓기 해줌.
- 저항성 품종을 선택, 역병 저항성 대목을 이용한 접목재배를 해줌.

☑ 담배나방

- 알에서 깨어난 **어린 유충이 과실 속으로 파고 들어가기 전에 살포**하는 것이 효과적임.
- 6월 하순~7월 상순부터 작용기작이 다른 2종류 이상의 약제를 10일 간격으로 4회 정도 교호로 살포

☑ 총채벌레

- 꽃노랑총채벌레는 **토마토반점위조바이러스(TSWV)**를 매개함.
- 꽃, 신초를 잘 살펴 초기부터 방제하고 다른 계통의 약제를 번갈아 사용



| 탄저병



| 역병



| 담배나방



| 총채벌레

02 고온(폭염) 및 가뭄 대비

☑ 예상 문제점

- 고온, 토양 건조가 심하면 개화가 불량하거나 꽃봉오리, 열매가 떨어짐.
- 양분 흡수, 이동이 잘 안 되어 석회 결핍과 강한 햇볕으로 인한 일소과 발생
- 뿌리 기능이 약해져 식물체 시들음 증상 발생

☑ 대책

- 적정 토양 수분을 유지하고 건조하지 않도록 관리
- 일소과, 석회결핍과 등 피해 입은 과실은 빨리 제거하는 것이 다음 착과에 유리
- 석회결핍과 예방을 위해 염화칼슘 0.3~0.5%, 제4종 복합비료를 엽면시비해 줌



| 낙화 및 낙과 발생



| 석회 결핍과



| 일소과

03 집중호우 대비

☑ 예상 문제점

- 침수로 인한 뿌리활력 저하 및 생육 불량
- 역병, 탄저병, 반점세균병, 담배나방 등 병해충 발생 증가

☑ 대책

- 겉흙이 씻겨 내려갔을 경우에는 복주기 실시
- 탄저병 등 병해 발생이 증가하므로 비 온 뒤 약제 살포
- 식물체가 연약해지기 쉬우므로 엽면시비를 통해 세력 회복

04 익은 고추 적기 수확하기

☑ 수확 적기 : **꽃이 핀 후 약 45~55일경** 과실이 진홍색으로 변했을 때

- 고추는 꽃이 핀후 45~55일에 완숙되며 착색완료 후 4~5일 뒤에 수확해야 말린 고추의 색택이 좋음.
- 덜 익은 고추를 바로 건조하면 탈색, 비상품과가 많이 생기므로 수확 후 그늘에 펴 널어 2~3일 후숙시키면서 병든 과실 등은 제거해 줌.

고추재배 약제 저항성에 대한 대책



- ✓ 불필요한 농약 사용 최소화
- ✓ 정확한 농약 선택 및 적기 살포
- ✓ 동일약제 혹은 작용기작(작용원리)이 같은 약제 연속 사용 금지
- ✓ 내병성 품종 재배로 병 발생 억제
- ✓ 작물 생육 환경 개선(재식밀도 조정, 적기·적량 비배 관리, 연작 피하기)

작용기작이 같은 농약은 연속으로 사용하지 마세요!

작용기작 표시

다1

살균제 다1

농약 등록번호: 00-살균-00
보통독성(생태독성등급)

가1

살균제 가1

**동일 숫자나 영문
확인하세요!!**

▶ 포장지 후면

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	인정사용기준	
			1,000㎡(10a)당 사용량	사용시기 / 사용횟수
파	역병	파종 전 토양혼화처리	6kg	파종전 1회 이내
고추 (단고추류)	탄저병	파종 전 토양혼화처리	6kg	파종전 1회 이내

농약

특징

- 이 농약은 요소계 약제로서 예방 및 치료효과를 겸비한 약제입니다.
- 이 농약은 흑색썩음균핵병에 뛰어난 효과를 보입니다.
- 이 농약은 약효 지속기간이 긴 약제입니다.

△취급제한기준

- 이 농약은 약품, 식료품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관하십시오.

△약효·악해에 관한 주의사항

- 이 농약은 적용대상 작물 이외에는 악해의 위험이 있으므로 사용하지 않습니다.

※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 않습니다.

△안전 및 기타 주의사항

- 이 농약은 마스크, 고무장갑, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리시며 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
- 불지를 뜯을 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.

성분

유효성분 : Pencycuron 3%
기 타 : 계면활성제, 점결제, 색소, 증점제 95.3%

- ◆ 사용한 빈 농약 용기를 마을 수집점에 모아주면 한국환경공단에서 수거하고 있습니다.
- ◆ 기타 자세한 사항은 문의하십시오.

농약 포장지! 표시내용 이렇게 확인하세요

▶ 포장지 전면

실균제 다1

농약 등록번호: 00-살균-00
보통독성(생태독성등급)

작용기작 표시

잘들어 수확재 500g

경고문구

사용전에 표기내용을 잘 읽어 보주세요.
표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마세요.
어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.

- 중독상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것임
- 농약을 잘못써서 생체해를 경운 약제로 구토 시까지 빨고 즉시 의사 진료를 받으십시오.
- 눈에 들어갔을 경우 즉시 대량의 물로 씻어 내십시오

고객상담번호 : 0000-0000

해독 응급처치

독성 색띠

그림문자

마스크

고무장갑

방제복

아cular성

광열독성

누출독성

조류독성

※ 작용기작이 다른 약제 선택하거나 다른 계통 약제 번갈아 사용해야 약제저항성 발생을 최소화시킬 수 있음.

※ 적용 대상작물, 적용 병해충, 사용시기 및 방법, 사용량, 안전사용 기준 준수 철저

- ▶ 살균제 : 가~, 나~, 다~ (**동일글자**로 시작하는 농약을 연속으로 살포하지 말 것)
- ▶ 살충제 : 1~, 2~, 3~, (**동일숫자**로 시작하는 농약을 연속으로 살포하지 말 것)
- ▶ 제초제 : A~, B~, C~, (**동일영문**으로 시작하는 농약을 연속으로 살포하지 말 것)



수확량 낮아먹는 과수 병해충, 장마 뒤 방제 철저!

01 과수 탄저병

☑ 병해충 발생 전망

- 장마 시작과 함께 병원균 증식의 최적 조건(25℃ 전후 고온다습)이 형성되어 7월 중순 이후 피해과율 급격히 상승 예상
- * (복숭아) 수확기와 강우가 겹칠 경우 중·만생종 주재배지 중심으로 병발생 증가 우려
- * (사과) '홍로'는 탄저병 발생 고위험 품종으로 7월부터 발생률 급증 우려

☑ 방제 및 조치사항


- 장마 전부터 주산지 및 취약지를 우선으로 집중 예찰 강화
- 보호 살균제 등을 예방 살포하는 강우 전 선제적 방제
- 병든 과실 즉시 제거 및 통풍·배수관리 등 과원 환경 관리를 통한 병 확산 차단 필요
- * 강우 전 보호용 살균제를 열매 표면에 약제 막이 형성되도록 살포하고, 강우 후에는 약효가 떨어질 수 있어 치료용 살균제 살포
- * (보호용 살균제) 캡탄(트리할로메칠치오계), 만코제브(유기유황계) 등
- * (치료용 살균제) 테부코나졸(아닐라이드계), 펜티오피라드(티오펜계) 등



| 중생종 '홍로' 탄저병 증상



| 탄저병 표면 증상



| 탄저병 발생 증상(V병반)


02 나방류(복숭아순나방·복숭아심식나방)

☑ 병해충 발생 전망

- 5~6월 고온·건조 환경으로 전년 대비 2세대 성충 우화 시기가 앞당겨질 수 있으며, 7월 장마 사이 비가 그치는 소강상태나 장마 종료 직후 고온다습한 환경에서 3세대 성충이 집중 산란 가능성 있음

☑ 방제 및 조치사항

- 성페로몬을 이용해서 예찰 방제를 하는 것이 방제효율을 높일 수 있음
- **7월중·하순 어린 유충기**(알에서 부화하는 시기 및 1~2령 이하)에 **등록 약제로 방제**
 - * 복숭아순나방과 복숭아심식나방 동시 방제 약제 : 다이아마이드계(작용기작 28번), 메타-디아마이드계(작용기작 30번), 스피노신계(작용기작 5번) 등



| 트랩 유인 복숭아순나방



| 복숭아순나방으로 인한 사과 피해 양상

03 응애류(점박이응애, 사과응애)

☑ 병해충 발생 전망

- 장마철의 기습 폭우로 인해 **단기적으로 발생 밀도가 감소**할 수 있으나, 장마 기간 중 약제 방제를 소홀히 하거나 비가 갠 후 **고온이 지속되면** 알에서 부화한 개체들이 **잎 뒷면을 중심으로 빠르게 재증식** 가능성이 높음
 - * (온도발육속도) 점박이응애 알부터 성충까지 12일 소요(20℃) → 7일(30℃)

☑ 방제 및 조치사항

- **장마 시작 직전** 수관 내부까지 약제가 닿도록 작용기작이 다른 **응애 전문 약제를 교차로 살포**
- 장마 소강상태 시 잎 뒷면을 정밀 관찰하여 밀도 추이에 따라 알, 유충, 성충 전 세대에 걸쳐 동시에 방제할 수 있는 **복합작용 약제로 즉시 추가 방제** 실시
 - * 응애 전문 방제 약제: 에톡사졸계(작용기작 10번), 비페나제이트계(작용기작 20번), 테트라닉산 유도체계(작용기작 23번), 아시노나피르계(작용기작 33번) 등

※ 적용 대상작물, 적용 병해충, 사용시기 및 방법, 사용량, 안전사용 기준 준수 철저

알이 차오르는 땅콩 성숙기 재배관리



적절한 물 관리, 적기 병해충 방제로 수량 확보!

01 재배특성 ※ 수확시기 : 9~10월(조생 9월 중~하순, 만생 9월 하순~10월 상순)

- ✓ 땅콩은 6월에 꽃이 핀 후, 꼬투리가 형성되기 시작하는 3주 동안 빠르게 자라고, 이후 11~12주 동안 무게가 점차 늘어남
- ✓ 7~8월은 알이 차오르는 성숙기로, 이 시기에 토양 수분이 부족하거나 지나치게 많으면 수량이 감소하고 품질이 떨어질 수 있음

02 적절한 물 관리

- ✓ (수분 부족) 윗잎부터 시들기 시작, 잎 두께가 얇아지고 줄기 뒤틀림 현상
- ✓ (수분 과다) 잎 황화, 낙엽병류의 발생이 많아지고, 양·수분 흡수력 저하
⇒ **요소비료 1~2%액(요소 20~40g/물 20L) 엽면시비**로 생육 회복시킴



↓ 물 부족 증상(잎, 줄기 꼬임)



↓ 습해로 인한 증상(황화, 낙엽)

03 주요 병해충 관리 * 병해충 발생 초기 살균·충제 처리로 밀도를 낮게 관리함

- ✓ 성숙기 병해충 : **병(갈색무늬병, 그물무늬병, 흰비단병), 해충(풍뎅이류)**
 - (흰비단병) 초기 시들 증상, 줄기 하단에 흰색 균사 ⇒ 흙과 함께 제거
 - (풍뎅이류) **유충 부화기(7월 하순)에 땅콩 포기 중심으로 토양 살충제 살포**



↓ 갈색무늬병(아래부터 발생)



↓ 그물무늬병



↓ 흰비단병(배수불량, 연작지)



↓ 풍뎅이류

뿌리 생장을 위한 도라지 꽃대 제거요령



01 도라지 특성 및 효능 ※ 수확시기 : (식용) 파종 2~3년 후, (약용) 3~4년 ↑, 가을철

- ✓ 국내육성 품종으로는 '장백(흰색 꽃)', '으뜸(보라색 꽃)' 품종이 있음
- ✓ 종자로 번식, 토심이 깊고 물빠짐이 양호하며, 유기물 함량이 높은 토양을 좋아함
- ✓ 산나물로 수요가 높고, **뿌리는 건강기능성 식품**으로 기침, 가래, 거담을 없애는 작용을 하여 감기 예방, 비염 등 호흡기 질환 개선 등에 효과가 있고, 폐를 맑게 해주며 인후 부위를 편안하게 하는 효과가 있음

02 도라지 꽃은?

- ✓ 초롱꽃과의 여러해살이풀로 7~8월에 흰색, 보라색으로 꽃이 피م(꽃말 : 영원한 사랑)
- ✓ 꽃은 밤에 활짝 터지고, 꽃봉오리가 풍선처럼 생겨서 '풍선꽃'이라고도 함
- ✓ 미국, 유럽 등에서 관상용 꽃으로 인기 있음



| 흰색 꽃



| 보라색 꽃

02 도라지 꽃 숙음작업은 뿌리 수량 증대에 도움

- ✓ 도라지 꽃대 제거와 뿌리 생육의 상관관계
 - **뿌리**는 봄부터 꽃망울이 생기기까지 계속 자라다가, **꽃이 피기 전부터 종자가 익을 때까지는 더디게 자라기 때문에** 뿌리 생장을 촉진하기 위해서 **꽃대를 제거하는 것이 효과적임** (개화~열매 결실에 영양 과다 소모)
- ✓ 꽃대 제거 시기 : 꽃이 핀 후 15~25일 경
- ✓ 꽃대 제거 위치 : **종실이 형성되는 부위의 15cm 아래부분을 제거**해 줌 (대체로 줄기 부분에서 전체 길이의 25% 정도 제거)
- ✓ 꽃대 제거 효과 : 수량 15~35% 증가



| 꽃 숙기 전



| 꽃 숙기 후

고온기 가축 및 축사 환경관리



- ☑ 27~30℃ 이상 고온이 지속
→ 체온 상승, 음수량 증가, 사료섭취량 감소에 따른 증체량 감소와 번식장애 발생
- ☑ 송풍팬, 운동장 그늘막, 안개분무, 그리고 수조를 점검·보수하고, 가축 생산성 저하에 따른 고온 스트레스 요인 최소화
- ☑ 단열 보강을 통해 축사 천장의 태양 복사열을 막아주고, 스프링클러로 지붕 위 물 뿌리기로 온도 낮추기
- 차광막 설치로 직사광선을 막아주고 바닥온도 상승 차단
- ☑ 여름철에 물 섭취량이 증가하면 깨끗한 물을 충분히 섭취하도록 급수량 확인
→ 청결한 급수조 유지에 항시 노력
- ☑ 단위 면적당 적정 사육두수를 유지하고, 축사 주변에 잡초와 물웅덩이를 제거하여 해충 발생을 방지, 정기적인 소독 실시
- ☑ 사료 변질을 막기 위해 적절한 양을 구입하고 건조하게 보관, 위생적으로 사료조 관리하기
- 사료빈 내부는 외벽의 열 차단 단열재와 차광막 설치, 흰색 도료 칠하기로 온도 상승 사전 차단
- ☑ 충분한 환기를 통한 가축 체감온도와 축사 내부 온도 낮추기, 자연바람의 한계는 환풍기와 송풍팬 활용으로 극복하기
- 환기팬에 먼지, 거미줄은 성능저하 요인. 주기적 청소와 점검
- 필요 시 냉풍기와 안개분무장치를 동시에 설치하여 가동



| 터널식 쿨링시스템 가동



| 안개 분무장치 가동



| 흰색 도료 칠하기



주요농산물 가격정보

(단위: 원)

구분		서울	부산	광주	순천	전국평균	전년동월
쌀 20kg	유기농	-	-	-	-	-	129,340
	무농약	-	-	-	-	-	139,000
	일반	60,400	60,633	61,450	68,600	61,398	59,778
감자 (수미) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	8,440
	무농약	-	-	-	-	-	7,315
	일반	2,910	2,530	4,200	2,700	3,120	3,540
상추 (적) 100g	유기농	-	-	-	-	-	1,921
	무농약	-	-	-	-	-	2,022
	일반	1,284	1,300	1,110	730	1,176	1,204
깻잎 100g	유기농	-	-	-	-	-	5,297
	무농약	-	-	-	-	-	6,573
	일반	2,040	1,790	1,935	1,605	1,898	2,646
양파 1kg	유기농	-	-	-	-	-	4,234
	무농약	-	-	-	-	-	5,134
	일반	1,511	1,833	1,885	1,760	1,618	1,884
마늘 (깐마늘) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	-	-	-	-	-	31,412
	일반	9,798	9,255	12,700	9,660	10,144	12,740
토마토 1kg	유기농	-	-	-	-	-	7,637
	무농약	-	-	-	-	-	7,298
	일반	3,858	4,193	5,565	4,000	4,159	4,674
파 (대파) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	6,103
	무농약	-	-	-	-	-	11,750
	일반	2,819	2,538	2,470	2,830	2,570	2,318
팽이버섯 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	-	-	-	-	-	5,240
	일반	3,347	3,200	3,733	2,913	3,387	3,693

※ 자료출처 : 한국농수산물유통공사(2026. 7. 10.), 유기농, 무농약(2025. 7. 16. 현재 미제공)

전년동월(2025. 7. 8. / 유기농, 무농약) 기준

※ 자료검색방법 : www.kamis.or.kr(친환경농산물, 가격정보→소매가격→품목별을 이용하면 보다 다양한 농산물의 가격정보를 검색할 수 있습니다)

2026년 농기계임대사업소 (본점) 임대기종 임대료

※ 임대 농기계 현황 : 102기종, 175대/ 농기계 임대료 50% 감면 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

기종명		모델명	임대료(원)	50%감면
관리기 (8기, 35대)	소형	YK300QT/ TMS-30	11,000	5,500
	관리기	AMC-880S/ AMC-900/ AMC-1000	13,000	6,500
		관리기	AMC-900SM/ AMC-1000(신규)	17,000
	구굴기	YK650RK-K	13,000	6,500
	구굴기	YK750MK	17,000	8,500
트랙터 (6기종, 7대)	63마력	RX630PSC	179,000	89,500
	55마력	DK550R5	111,000	55,500
	55마력	L55H	179,000	89,500
	52마력	NX520SC	136,000	68,000
	45마력	L45H	136,000	68,000
	28마력	CK280	56,000	28,000
콤바인 (3기종, 3대)	자탈형	C805G/CX754	179,000	89,500
	범용	YH400-C	179,000	89,500
로우더 (1기종, 1대)	3.1톤	S590	158,000	79,000
쇄토기 (7기종, 18대)	145cm	WJ140CM/ YJ150GO/ YJ150OSG	11,000	5,500
	175cm	YJ175GS/ SW175BMG/ YJ175HG	13,000	6,500
	195cm	YJ195GM	17,000	8,500
심토파쇄기 (1기종, 2대)	3련	KP-3-AR	20,000	10,000
	3련	KP-3-AR(신규)	40,000	20,000
원판쟁기 (4기종, 4대)	6련	WDP60	32,000	16,000
	8련	YDP802L-H	24,000	12,000
	6련	SW06DPS-B	24,000	12,000
	8련	SW08DPS-B	28,000	14,000
고속쟁기 (1기종, 2대)	6련/치출형	WJ2106-HPK	20,000	10,000
이랑쟁기 (2기종, 2대)	4련	WJSP-4	11,000	5,500
	6련	WJSP-6	13,000	6,500
논두렁조성기 (2기종, 4대)	40cm	AZ-350CH	17,000	8,500
	40cm	WJLF380	20,000	10,000
배토기 (3기종, 3대)	보리(2굴)	T460	20,000	10,000
	보리(1굴)	WJG-300	13,000	6,500
	두둑형성	DH450	11,000	5,500
비닐피복기 (3기종, 5대)	비닐피복 (관리기)	AM-180R	9,000	4,500
	휴립피복 (관리기)	FM-120N	9,000	4,500
	휴립피복 (트랙터부착)	DS-H1700	40,000	20,000
땅속 작물수확기 (6기종, 10대)	경운기 부착	DS-650/ DRK-650	11,000	5,500
	감자, 고구마용	HD-C1000G	17,000	8,500
	당근, 감자용	DS-1400T1	20,000	10,000
	당근, 감자용	DS-1400T3	24,000	12,000
	고구마용	MH-620A	28,000	14,000
돌수집기 (3기종, 5대)	1,400mm	DR-1400T	24,000	12,000
	1,400mm	SH-L1400T	28,000	14,000
	1,400mm	SH-A1400B(신규)	32,000	16,000
파이프밴딩기 (2기종, 2대)	25~32mm	BS-15	20,000	10,000
	25~32mm	HB-2532B	28,000	14,000

기 종 명		모 델 명	임대료(원)	50%감면
이앙기 (4기종,5대)	승용	ERP60DZ/ YR60D	94,000	47,000
	승용	ERP60	73,000	36,500
	포트	RX60	166,000	83,000
파종기 (11기종, 16대)	인력(1조)	JD-1(콩)/ JP-1(채소)	9,000	4,500
	인력(3조/채소)	JP-3	9,000	4,500
	인력(6조/채소)	JP-6	11,000	5,500
	동력(1조/콩)	JDEV-1	13,000	6,500
	동력(10조/채소)	SW-10PM	20,000	10,000
	동력(10조/채소)	JAS-1000C	24,000	12,000
	동력(6조/마늘)	GSW-6000B	32,000	16,000
	포트(모판)	LSPE-40	28,000	14,000
	트랙터(2조)	DRP-1002SPN	73,000	36,500
이식기 (1기종,2대)	트랙터(4조)	JDT-4R	28,000	14,000
	동력/채소	JP/PH1A	35,000	17,500
제조기 (8기종,14대)	동력(논두렁제초)	SSP850/ SWM606	17,000	8,500
	동력(제초)	HR-900	13,000	6,500
	동력(제초)	HR-900(신규)	20,000	10,000
	동력(넙쿨)	SHRT661	32,000	16,000
	동력 (사료작물수확)	SBM91	24,000	12,000
	동력(콩예취)	BH-710AII	24,000	12,000
	트랙터부착 (함마로타리식)	DLK135P	32,000	16,000
	트랙터부착 (넙쿨파쇄)	DRCT-1500SN	20,000	10,000
동력운반차 (2기종,3대)	0.5톤	MX-E600DL(배터리)/ MX-500DL(엔진)	28,000	14,000
분무기 (2기종,3대)	4륜말차형	KS-80A/ JI-80A	11,000	5,500
퇴비살포기 (2기종,2대)	트랙터견인형	TKT-S2000	28,000	14,000
	차량탑재형	HMCM-1000	56,000	28,000
비료살포기 (2기종,3대)	1톤	STF-1000D	13,000	6,500
	0.5톤	STH500	11,000	5,500
동력탈곡,정선기 (4기종,5대)	잡곡탈곡	ESP-M2	17,000	8,500
	콩탈곡	SB-1000S	11,000	5,500
	콩선별	SB-E8	11,000	5,500
	잡곡정선	SB-200GI	11,000	5,500
모우어 (1기종,2대)	디스크형	MDM1750	56,000	28,000
집초기 (2기종,2대)	집초	LINER350S	28,000	14,000
	반전집초	LRT420	40,000	20,000
베일러 (1기종,1대)	원형	L310	166,000	83,000
베일러집게 (1기종,1대)	로더부착형	SH-G30L	20,000	10,000
롤퍼복기 (2기종,2대)	Ø90~100cm	LW500A	56,000	28,000
	Ø95~115cm	LW630A	136,000	68,000
동력파쇄기 (3기종,4대)	18마력	DLK18TRC	40,000	20,000
	23, 21마력	DLK23TRC/ DLK210TRC	56,000	28,000
자동전지가위 (3기종,6대)	45mm	M45	13,000	6,500
	45mm	C45 250	17,000	8,500
	45mm, 고지형	D45-1500	20,000	10,000
전동핸드톱 (1기종,1대)	15cm	SELION M12	20,000	10,000

농기계 임대 문의: 농기계임대사업소 ☎ 659-4466 * 자세한 사항 : 여수시농업기술센터 누리집 (<http://ysagr.yeosu.go.kr>)



01 무더위 안전한 농작업을 위한 온열질환 예방 “농사보다 사람이 먼저 !”

문의 농촌진흥과 농촌자원팀(☎659-4433)

- 올 여름 전국적인 무더위가 예상됨에 따라 농작업 주의사항 -

- 낮 시간 논·밭, 비닐하우스 등 야외작업을 자제하세요.
- 폭염안전수칙(물 자주·충분히 마시기, 그늘을 확보, 휴식 취하기) 준수하세요.
* 휴식 : 체감온도 33℃ 이상 시 - 매 2시간 이내 20분 이상 휴식이 필요합니다.
- 열사병, 탈진 등 건강에 유의하세요. 온열질환자(의심자) 발생 시 즉시 119 신고 등 응급 대응.
- 1인 작업 금지
- 부모님 안부 묻기 등 안전에 주의하세요.

02 중금속분석실 운영 안내

문의 기술보급과 농산물안전분석실(☎659-4474)

- 운영기간 : 연중 09:00~18:00(토·일요일, 공휴일 제외)
- 사업대상 : 여수시에 주소지와 경작지를 둔 농업인
- 분석항목 : 중금속 8종
- (토 양) 카드뮴, 구리, 납, 니켈, 아연, 수은, 비소, 6가크롬
- (농산물) 카드뮴, 납, 비소(쌀에 한하여 분석)
- 접수장소 : 농업기술센터 종합 실험·연구동 민원접수실(1층)
- 검사비용 : 토양 113,700원 / 농산물 80,000원(쌀의 경우 120,000원)
- 수수료 면제 대상 : 여수시에 주소지와 경작지를 둔 농업인의 경우 면제

03 농산물 잔류농약 검사 안내

문의 기술보급과 농산물안전분석실(☎659-4474)

- 운영기간 : 연중 09:00~18:00(토·일요일, 공휴일 제외)
- 사업대상 : 학교급식, 로컬푸드 등의 인증 또는 영농을 목적으로 하는 여수시에 주소지와 경작지를 둔 농업인
- 분석항목 : 농산물 잔류농약 463종
- 접수장소 : 여수시농업기술센터 종합실험·연구동 민원접수실(1층)
- 검사비용 : 1건당 174,000원
- 수수료 감경 대상 : 1건당 58,000원/ 여수시에 주소지와 경작지를 둔 농업인
- 수수료 면제 대상 : 친환경, GAP(농산물우수관리인증) 등 품질인증이나 로컬푸드, 학교급식에 참여하는 여수시에 주소지와 경작지를 둔 농업인

04 친환경 유용미생물 연중 무상공급

문의 기술보급과 유용미생물 배양실(☎659-4469)

- 공급기간 : 연중 09:00~18:00(토·일요일, 공휴일 제외)
- 공급장소 : 여수시농업기술센터 유용미생물 배양실
- 미생물종류 : 4종(광합성균, 고초균, 유산균, 효모균)
- 공급방법 : 여수시민 무상공급(본인 직접방문 수령)
※ 방문신청시 여수시민 확인을 위해 신분증 지참 / 목적외 사용, 미사용·방치 시 공급이 제한 될 수 있음
- 용 도 : 농업(토양개량, 생육촉진 등), 축산·생활·환경(악취저감, 환경정화 등)

여수시 기술보급과 직원 일동은 맑은 마음과 바른 자세로,
원칙과 청렴을 최우선으로 삼아 깨끗하고 투명한 시정을 실천해 나가겠습니다 !